

Příznaky hyperaktivního močového měchýře

Charakterizované nedobrovolnými kontrakcemi močového měchýře. Tento syndrom se projevuje především jako časté, náhlé a nekontrolovatelné nutkání močit kdykoli, ve dne i v noci a může někdy vést k úniku moči."



Nutkavé močení

Nutkání k močení je nepotlačitelné a naléhavé.



Časté močení

Potřeba močit více než 8x za den



Noční močení

Potřeba močit minimálně jednou za noc



Nutkavá inkontinence

Není možné zadržet moč.

Stimulace nervus tibialis posterior

Tensi+ využívá techniku transkutánní elektrického nervové stimulace (TENS) zadního tibiálního nervu. Tato technika je neinvazivní a nemá žádné známé vedlejší účinky."

Klinicky ověřeno*:

Plný účinek dosažen po 3 měsících léčby.

Jedno 20-ti minutové sezení denně po počáteční období 3 měsíců umožňuje zmírnit příznaky hyperaktivního močového měchýře a zlepšit kvalitu života.

Cornu JN, Donon L, Thullier C, Meyer F, Klap J, Campagne-Loiseau S, Mariadassou A, Peyronnet B, New Tensi+ Device for Transcutaneous Posterior Tibial Nerve Stimulation: A Prospective, Multicentre, Post-market Clinical Study, European Urology Focus, 2024

Tellenbach M, Schneider M, Mordasini L, Thalmann GN, Kessler TM. Transcutaneous electrical nerve stimulation: an effective treatment for refractory non-neurogenic overactive bladder syndrome? World J Urol. 2013 Oct 31.

Tensi+ : inovativní a intuitivní zdravotnický prostředek



Jednoduše se připevňuje



Jednoduše se používá



Je diskrétní



Autonomní použití

Vyvinuto ve spolupráci s francouzskými urology - odborníky specializujícími se na léčbu hyperaktivního močového měchýře a navrženo ve spolupráci s pacienty.

Tensi+ je indikován k léčbě idiopatického nebo neurogenního hyperaktivního močového měchýře. Tensi+ je vhodný pro dospělé muže a ženy jakéhokoli věku.



Léčba

- **1.týden :** používejte Tensi+ každý den po dobu 20 minut.
- **6.týden :** lze pozorovat pokles příznaků a první účinky léčby.
- **12. týden:** dochází k významnému zlepšení symptomů hyperaktivního močového měchýře. Počáteční fáze léčby je tímto ukončena.
- **Následující týdny:** k udržení dosaženého stavu používejte Tensi+ dle potřeby.

